

Tag	Stärke	Dauer	Art und Ort				Begleitsymptome				Auslöser	Medikamente	Anzahl			Wie hat das Medikament geholfen?			
			pulsierend/pochend	dumpf/drückend	einseitig	beidseitig	Erbrechen	Übelkeit	Lärmscheu	Lichtscheu			Sehstörungen	Tropfen	Tabletten	Zäpfchen	gut	mittel	schlecht
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			



Legende

Schmerzstärke
 ↑stark →mittel ↓schwer

Dauer
 ○ weniger als 6 Stunden ● 7 - 12 Stunden □ länger als 12 Stunden

Pflichtangaben

Thomapyrin® CLASSIC Schmerztabletten
 Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bei akuten leichten bis mäßig starken Schmerzen. Schmerzmittel sollen längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befragen des Arztes angewendet werden. Enthält Lactose. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungs-beilage und fragen Sie Ihren

Thomapyrin® INTENSIV
 Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren zur Behandlung von akuten Kopfschmerzen (z. B. Spannungs-kopf-schmerzen) und Migräneanfällen (mit und ohne Aura). Schmerzmittel sollen längere Zeit oder in höheren Dosen nicht ohne Befragen des Arztes angewendet werden. Enthält Lactose. Zu Risiken